

Schädlinge im Raps

28. August – 1. September 2014

Aufgrund der diesjährig verzettelten Rapssaat liegen bisher nur von 2 Versuchsfeldern Daten vor: Oberkorn und Fischbach (Ösling). Rapserrdfloh fand sich noch nicht. Der Zuflug der Kohlfiege war sehr gering, was durch die dauerhaften Niederschläge zu erklären ist.

Tabelle 1: Erfassung der Rapsschädlinge am 01. September 2014.

Region	Minette	Mosel	Gutland		Ösling
Standort Sorte Beize Beiz-Wirkstoff Saattermin	Oberkorn DK Eximus (H) TMTD Thiram 20. August	Burmerange	Everlange	Bettendorf	Fischbach DK Excellium (H) TMTD Thiram 24. August
Rapserrdföhe pro Gelbschale seit 25. August Bekämpfungsrichtwert beträgt 50 Käfer pro Gelbschale in 10 Tagen	0	Noch keine Daten. Aussaat noch nicht erfolgt.			0
% zerstörte Blattfläche durch den Rapserrdfloh Bekämpfungsrichtwert: 10%	0				0
Zuflug Kohlfiege Bekämpfungsrichtwert unbekannt	gering				gering
Pflanzenkrankheiten	---				---
Entwicklungsstadium Raps in BBCH*	09				08-09

* BBCH 08 = Hypokotyl mit Keimblättern wächst zur Erdoberfläche; BBCH 09 = Keimblätter durchbrechen Bodenoberfläche

KONTAKT: Dr. Michael Eickermann (eickerma@lippmann.lu)