



# Pflanzenbau aktuell



## Organische Dünger im Herbst und Winter auf Grünland effizient verwerten

Ein bedarfsgerechter und umweltschonender Einsatz organischer Dünger stellt eine besondere Herausforderung im Rahmen des Nährstoffmanagements dar. Anzustreben ist eine hohe Ausnutzung der in den Wirtschaftsdüngern enthaltenen Nährstoffe, um Nährstoffüberhänge und -verluste zu reduzieren und Kosten beim Mineraldünger einzusparen. Mit am effizientesten lassen sich hofeigene Dünger auf Grünland verwerten, zudem stammt der überwiegende Teil der darin enthaltenen Nährstoffe vom Grünland, so daß eine Rückführung sinnvoll erscheint.

### Herbstgülle auf Grünland

Im Herbst läßt sich die Gülle sicherlich ökologisch und ökonomisch am sinnvollsten auf Grünland verwerten. Milchviehgülle enthält durchschnittlich bei 8,5% Trockenmasse etwa 4,1 kg N/cbm (davon ca. 2 kg mineralischen Ammonium-N); 1,7 kg Phosphat und 4,7 kg Kalium. Diesbezüglich sollte man Gülle auf keinen Fall als „Entsorgungsprodukt“, sondern als einen der günstigsten und wertvollsten Dünger, über die man als Landwirt verfügt, ansehen.

Eine **effiziente Gölledüngung** im Herbst ist jedoch oft ein **Spagat zwischen der Befahrbarkeit der Flächen und einer guten Nährstoffausnutzung**. Grundsätzlich

gilt: Je später im Herbst die Güllegabe, umso besser ist die Stickstoffausnutzung und umso niedriger sind die Verluste. Denn gelingt es, die Gölledüngung in geringen Mengen erst kurz vor Vegetationsruhe auszubringen, so ist die Stickstoffaufnahme durch die Grünlandpflanzen in der Regel sehr gering und trotzdem werden kaum Auswaschungsverluste zu verzeichnen sein. Dies läßt sich dadurch erklären, daß das Ammonium aus der Gülle aufgrund der meist kälteren Bodentemperaturen nicht mehr zu leicht löslichem Nitrat umgewandelt werden kann. Somit werden Reserven an Göllestickstoff geschaffen, die bis zum Zeitpunkt des Pflanzenverbrauchs im nächsten Frühjahr im Boden gelagert werden. Die Witterung ist ebenso entscheidend: bei bedecktem Himmel, leichtem Nieselregen und/oder niedrigen Temperaturen sind die Stickstoffverluste durch Verflüchtigung des Ammoniaks minimal.




*Abbildung 1: Unter Berücksichtigung von pflanzenbaulichen und umweltrelevanten Aspekten kann im Herbst eine dem Zeitpunkt angepasste Gölledüngung auf Dauergrünland sicherlich sinnvoll sein.*

Nach den obigen Gegebenheiten kann die für den ersten Schnitt des nächsten Jahres notwendige Güllemenge (15-20 cbm/ha), unter 80% Anrechnung der in der Gülle enthaltenen Nährstoffe, bereits im Herbst ausgebracht werden. Im Frühjahr benötigen diese Parzellen keine weitere Güllegabe mehr. Der Kalianteil in der Gülle übernimmt des weiteren eine Frostschutzfunktion, indem er den Gräsern eine höhere Frosthärte verleiht. Im Herbst begüllte Flächen ergrünen im Frühjahr zudem wesentlich früher als Parzellen ohne organische Herbstdüngung.

Wird der Ausbringungstermin hingegen zu weit hinausgezögert, besteht die Gefahr, daß herbstliche Niederschläge eine Ausbringung ohne Fahrschäden nicht mehr ermöglichen.

Erfolgt die herbstliche Güllegabe hingegen zu früh bei zu warmen (Boden)Temperaturen, wird das Ammonium noch im Herbst zu Nitrat umgewandelt. Der somit direkt pflanzenverfügbare Stickstoff regt die Pflanzen noch zu weiterem Wachstum an. Stellen die Gräser ihren Stoffwechsel aber nicht auf die bevorstehende Vegetationsruhe um, so steigt die Gefahr von Auswinterungsschäden deutlich an. Wird die Herbstgülle dennoch frühzeitig an warmen Oktobertagen ausgebracht, ist es ratsam die Menge zu begrenzen (10 cbm/ha) und die gleiche Parzelle im zeitigen Frühjahr nochmals mit einer verringerten Güllemenge zu düngen.

**Es ist jedoch zu beachten, daß vom 1. September bis zur Sperrfrist am 15. November landesweit nur 80 kg N/ha ausgebracht werden dürfen, in ausgewiesenen Wasserschutzgebieten beginnt das Ausbringungsverbot bereits am 1. Oktober.**



**Graphik 1:** Optimaler Zeitpunkt für die beste Wirksamkeit des Güllestickstoffs, ausgedrückt in Prozent im Vergleich zum optimalen Zeitpunkt im zeitigen Frühjahr (verändert nach Agra-Ost).

Beachten Sie auch die geltenden **Abstandsauflagen**: 50 m zu Quellen, Brunnen und Wasserbehältern, 20 m zu bewohnten Gebäuden und 10 m zu Oberflächengewässern!

#### Mist bzw. Mistkompost auf Grünland

Im Gegensatz zur Gülle, die eher kurzfristig wirkt, kann Mist bzw. Mistkompost als ein **Langzeitdünger** betrachtet werden, welcher den N-Pool des Bodens allmählich vergrößert und über längere Zeiträume für eine natürliche und kontinuierliche N-Nachlieferung sorgt. Es wird somit nicht die Nährstoffwirkung einer gezielten Güllegabe erreicht.

Bei der **Frischmistausbringung** im Grünland kommt es oft zu Verunreinigungen des Futters, weil das Stroh bei der Ernte noch nicht vollständig verrottet ist. Außerdem können „Mistpakete“ zu Schäden an der Grasnarbe führen. Weiterhin von Nachteil bei der Frischmistausbringung sind:

- Schlechte Schmackhaftigkeit des Grases (führt zu mehr Geilstellen)
- Samenvermehrung der nitrophilen Unkräuter, wie Ampfer, Vogelmiere, Taubnessel
- Verbreitung von Krankheitserregern (z.B.: Para-TB)
- Stickstoffverluste durch Verflüchtigung (zusätzlich zu den Sickersaftverlusten bei der Lagerung)

Die negativen Effekte lassen sich weitestgehend durch die **Kompostierung des Mistes** beheben. Sie steigert den agronomischen und wirtschaftlichen Wert des Mistes. Des weiteren werden die Stickstoffverluste in die Umwelt verringert. Der im Stallmist enthaltene Ammoniak- und Harnstoff-Stickstoff dient den Mikroorganismen (Pilze & Bakterien) als Nahrung zur Bildung von Mikrobeneiweiß und führt damit zur Mikrobenvermehrung. So liegt der Stickstoff am Ende des Umsetzungsprozesses fast vollständig in organischer Form vor. Durch die **Stabilisierung des Stickstoffs** in organischer Form, werden die Verluste durch Auswaschung und Oberflächenabfluß minimiert, es treten lediglich Verluste in Form von Gasverflüchtigungen beim Auf- und Umsetzen des Komposthaufens auf. Bei der Kompostausbringung sind die gesamten N-Verluste im Vergleich zu der Mistausbringung sehr gering. Wohingegen die Verluste bei der Ausbringung von Stallmist eine Höhe von 10 bis 15 Prozent des Gesamtstickstoffs erreichen können, dies sind ca. 0,45 bis 0,7 kg N<sub>org</sub> pro Tonne! Nach der Ausbringung sind durch die Stabilisierung des Stickstoffs im Gegensatz zum Stallmist beim Kompost keine N-Verflüchtigungen in die Atmosphäre mehr zu erwarten.




**Abbildung 2&3: Umsetzung einer Mistmiete und Ausbringung von Mistkompost.** Neben allen agronomischen und biologischen Vorteilen, die die Kompostierung gewährleistet, erlaubt die zerkrümelte Struktur von Mistkompost eine wesentlich bessere Verteilung auf Dauergrünlandparzellen als Mist. Die vergleichsweise schlechtere Verteilung des Mistes führt zu Lückenbildung, da die Mistklumpen die Grasnarbe teilweise zudecken und schädigen.

Das **C/N-Verhältnis** ist entscheidend für den Kompostierungsprozeß – es sollte über 20 liegen, nur so sind Sickersaftverluste und folglich Verluste an Stickstoff und Kali zu vermeiden. Anfallender Mist aus den Laufgängen eines Tretmiststalles besitzt meistens ein zu geringes C/N-Verhältnis, solcher aus dem Tiefstreubereich hingegen erweist sich als optimal. Das C/N-

Verhältnis >20 sorgt zudem für eine ausreichende Bildung an Pilzen. Diese erzeugen Phenole, die innerhalb der Kompostmiete wie ein Desinfektionsmittel wirken und somit die im Mist enthaltenen Bakterien neutralisieren. Kombiniert mit der Erhitzung der Mistmiete, die die Kompostumsetzung mit sich bringt, führt dieser Vorgang zu einer Zerstörung der Unkrautsamen (z.B. Ampfer).

Man kann auch davon ausgehen, daß mit dem reifen Kompost dem Boden ca. 50% mehr **Dauerhumus** zugeführt wird als mit vergleichbaren Stallmistmengen. Es handelt sich also um ein erstklassiges Boden- und Grasnarben-Verbesserungsmittel, das die Fähigkeit der Böden erhöht, Wasser zu speichern, Nährstoffe zu absorbieren und bei Bedarf wieder freizusetzen (Calcium, Kalium,...). Die regelmäßigen Kompostgaben auf Dauergrünlandparzellen fördern die Grünlandleguminosen und die hochqualitativen Gräser und haben somit einen positiven Impact auf die Bestandszusammensetzung des Grünlandes (siehe Graphik 2).



**Graphik 2:** Impact des Kompostes auf die Flora der Grasnarbe im Vergleich zu Mist (© Agrar-Ost VoG)

Die **Homogenisierung** und **Krümelstruktur** des fertigen Kompostes ermöglicht eine bessere Verwertung auf Grünland – im Gegensatz zu Frischmist oder nicht umgesetztem Mist einer Miete, welcher beim Ausbringen öfters größere Klumpen hinterläßt. Auf Weiden kann das ganze Jahr über ausgebracht werden. Die Kompostierung verleiht dem Mist einen erdigen Geruch, beeinträchtigt die Schmackhaftigkeit des Aufwuchses nicht und erlaubt eine Ausbringung in bewohnten Lagen. Bei Grünland zur reinen Schnittnutzung liegt der beste Zeitraum zwischen dem letzten Schnitt (Oktober) und spätestens Mitte Februar – so werden Verunreinigungen im Futter vermieden. Auf Mähweiden (1 oder 2) bietet sich alternativ auch eine Ausbringung nach der Mahd und vor der Beweidung an.

**In ausgewiesenen Wasserschutzgebieten muß jedoch ähnlich wie bei Gülle das Ausbringungsverbot vom 1. Oktober bis zum 1. Februar beachtet werden.**



**Abbildung 4:** Im Herbst auf eine Wiese ausgebrachter Mistkompost (20 t pro ha).

	Mist (kg/T)	Mistkompost (kg/T)
<b>N</b>	5,9	6,1
<b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	3	4
<b>K<sub>2</sub>O</b>	6	10
<b>CaO</b>	2,5	<b>16,3</b>
<b>MgO</b>	1,5	<b>2,7</b>

**Table 1:** Nährstoffgehalte von Mist im Vergleich zu Mistkompost.

Wird dennoch auf eine Kompostierung verzichtet, sollte zumindest eine Zwischenlagerung angestrebt werden. Im Gegensatz zur gezielten Kompostierung führt die einfache Lagerung von Stallmist am Feldrand auch nach längerer Zeit zwar nicht zur Kompostbildung, da die unerläßlichen Bedingungen der aeroben Umwandlung nicht gegeben sind. Dennoch werden zumindest in gewissem Umfang die erwünschten Prozesse (Hygienisierung, Stickstoffbindung, Zersetzung) erreicht, wenn auch in einem weitaus geringeren Maße als bei der Belüftung und Homogenisierung mit dem Mietenumsetzer. Es findet hier vielmehr eine Vergärung als ein aerober Umsetzungsprozeß statt.

Es sei darauf hinzuweisen, daß Betriebe, die landwirtschaftliche **Flächen** in **Belgien** bewirtschaften (Parzellen über Flächenantrag in Belgien deklariert) seit 2014 die auf diesen Flächen verplanten **organischen Dünger** vor der Ausbringung melden müssen. Die betroffenen Betriebe wurden dahingehend informiert. Hierbei sind die in Belgien geltenden Ausbringungstermine für Gülle, Mist und Kompost zu berücksichtigen.

*Die Pflanzenbauberater der Landwirtschaftskammer*