

Kooperationsprojekt **SENTINELLE**

Finanziert mit Hilfe der Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA).

SENTINELLE

31. August – 03. September 2015

Die Niederschläge vom Wochenbeginn haben den Saaten aus der 34. und 35. Kalenderwoche gut getan und das Wachstum gefördert. Zu Oberkorn schiebt sich bereits das zweite Blatt.

Bisher fanden sich nur in Obercorn Rapserrflöhe in den Gelbschalen. Junge Rapsschläge, die neben Mais oder einer Getreidestoppel stehen, sollten am Rand auf Schneckenfraß kontrolliert werden. Zu Burmerange fanden sich wieder vermehrt Rübsenblattwespen, die bereits intensiv mit der Paarung beschäftigt waren. Mit den ersten Raupen wäre in 10 Tagen zu rechnen. Die Raupen dieses Schädlings fressen an den jungen Blättern und können in einem warmen Herbst bei starkem Auftreten zu einem Problem werden. Der Fraß-Schaden ist dem Schaden durch Schnecken nicht unähnlich, es fehlen aber die Schleimspuren.

Momentan ist aber kein Handlungsbedarf.



Rübsenblattwespe (Foto: Eickermann)

Tabelle 1: Erfassung der Rapsschädlinge am 31. August 2015.

| Region | Minette | Mosel | Gutland | | | Ösling | |
|--|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| Standort | Oberkorn | Burmerange | Hobscheid | Everlange | Reisdorf | Flatzbour | Reuler |
| Sorte | Fonzzi (H) | Dalton (H) | Exception (H) | Avatar (H) | Exception (H) | Exception (H) | Alabama (H) |
| Beiz-Wirkstoff | Thiram | Thiram | Thiram | Thiram | Thiram | Thiram | Thiram |
| Saatetermin | 20. August | 21. August | 26. August | 29. August | 31. August | 31. August | 31. August |
| Rapserrflöhe pro Gelbschale Bekämpfungsrichtwert beträgt 75 Käfer pro Gelbschale vom 1.-20.09. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % zerstörte Blattfläche durch den Rapserrfloh Bekämpfungsrichtwert: 10% pro Pflanze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuflug Kohlflye Bekämpfungsrichtwert unbekannt | gering | mittel | gering | gering | gering | gering | gering |
| Schwarzer Kohltriebrüssler seit 1. September Bekämpfungsrichtwert: 50 Käfer in 3 Wochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pflanzenkrankheiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besonderheiten | --- | vermehrt Rübsenblatt- wespen! | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entwicklungsstadium Raps in BBCH* | 11-12 | 10 | 10 | 09 | 05 | 05 | 05 |

* BBCH 05: Keimwurzel ausgetreten; BBCH 09 = Keimblätter durchbrechen Bodenoberfläche; BBCH 10: Keimblätter voll entwickelt; BBCH 11: Erstes Laubblatt entfaltet; BBCH 12: zweites Laubblatt entfaltet.

- Bestand behandeln
- Bestand kontrollieren
- Keine Behandlung notwendig
- Bestand bereits behandelt

KONTAKT: Dr. Michael Eickermann
(michael.eickermann@list.lu)