

Schädlinge im Raps

05. – 12. September 2016

Der Raps leidet massiv unter der Trockenheit, was in einem sehr ungleichmäßigen Bestand resultiert. Teilweise finden sich Pflanzen im Stadium BBCH 10 (Keimblätter voll entwickelt) neben Pflanzen im Stadium BBCH 13 (3 Blätter entwickelt). Rapserrflöhe fanden sich nur sehr vereinzelt und sind momentan kein Problem. Der Bekämpfungsrichtwert ist erreicht und somit eine Insektizidmaßnahme erforderlich, wenn

- mehr als 10% der Blattfläche durch Fraß der Erdflöhe zerstört sind

ODER

- Sich 75 Rapserrflöhe pro Gelbschale im Zeitraum 01.- 20. September finden lassen, (50 Käfer Rapserrflöhe pro Gelbschale im Zeitraum 10.- 20. September, z.B. bei Spätsaaten) (50 Käfer Rapserrflöhe pro Gelbschale in 10 Tagen nach dem 20. September bis Ende Oktober)

ODER

- sich 3-5 Larven des Rapserrflöhens pro Pflanze finden lassen.



Bild 1: Ungleichmäßig entwickelter Bestand in Oberkorn.

In Bettendorf und Wahl fand sich sehr vereinzelt Falscher Mehltau an den Keimblättern. Gegen diese Krankheit sind aber keine Applikationen vorgesehen.

Tabelle 1: Erfassung der Rapsschädlinge am 12. September 2016

Region	Minette	Mosel	Gutland			Ösling	
Standort Sorte Beiz-Wirkstoff Saattermin	Oberkorn Bender (H) Thiram 26. August	Burmerange Dalton (H) Thiram 3. September	Simmern Exception (H) Thiram 26. August	Bettendorf Dalton (H) Thiram 24. August	Bigelbaach Exception (H) Thiram 26. August	Wahl Exception (H) Thiram 25. August	Reuler Dalton (H) Thiram 29. August
Rapserrflöhe pro Gelbschale Bekämpfungsrichtwert beträgt 50 Käfer pro Gelbschale in 10 Tagen (seit 29. Sept.)	3	0	3	2	3	4	0
% zerstörte Blattfläche durch den Rapserrfloh Bekämpfungsrichtwert: 10% pro Pflanze	0%	0%	2%	0%	0%	4%	0%
Zuflug Kohlflye Bekämpfungsrichtwert unbekannt	gering	gering	mittel	gering	gering	gering	gering
Pflanzenkrankheiten	---	---	---	Falscher Mehltau	---	Falscher Mehltau	---
Entwicklungsstadium Raps in BBCH*	10-13	10	10-11	10-12	10-11	12-13	10

* BBCH 10 = Keimblätter voll entwickelt; BBCH 11 = Erstes Laubblatt entfaltet; BBCH 12 = Zweites Laubblatt entfaltet; BBCH 13 = Drittes Laubblatt entfaltet



Verwenden Sie Pflanzenschutzmittel immer mit der notwendigen Sorgfalt. Vor der Anwendung eines Pflanzenschutzmittels müssen Sie das Etikett und die Produktinformationen lesen, sowie Warnhinweise und Warnsymbole in der Gebrauchsanleitung beachten. Die aktuell gültigen Anwendungsvoraussetzungen finden Sie unter <https://saturn.etat.lu/tapes>.

KONTAKT: Dr. Michael Eickermann (michael.eickermann@list.lu)
Luxembourg Institute of Science & Technology (LIST)
Department of Environmental Research & Innovation (ERIN)
41, rue du Brill | L-4422 Belvaux | LUXEMBOURG